



# 預防登革熱，解除蟲蟲危機！

請不要堆積雜物、清除積水容器、全力撲滅病媒蚊！

## 什麼是登革熱？

登革熱俗稱『天狗熱』或『斷骨熱』是由登革熱病毒引起的急性傳染病，它的傳播媒介是埃及斑蚊及白線斑蚊。

## 登革熱的症狀

典型登革熱疑似病例之症狀為發燒（38度以上）、激烈頭痛，後眼窩痛，骨骼關節或肌肉痛、發燒三～四天，身上出現紅疹，發燒期間全身發癢。出血性登革熱疑似病例主要有發燒、頭痛、肌肉痛、嘔吐、全身倦怠、腸胃道及子宮出血、血尿和恢復期出疹等。

## 登革熱的傳染途徑：

- (1) 登革病毒，只能存於人、猴及病媒蚊體內。
- (2) 登革熱之病媒蚊為埃及斑蚊和白線斑蚊。
- (3) 病毒必須藉由病媒蚊叮咬才能從人傳給人。
- (4) 病媒蚊叮咬登革熱病患（從開始發燒的前一天直到退燒都具有傳染力）八至十五天後，則具有終生傳染病毒的能力。

## 清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，是防治登革熱的根本方法：

- (一) 傳播登革熱的病媒蚊是埃及斑蚊及白線斑蚊。這兩種蚊子都是在白天吸血，吸血場所大多在屋內或野外陰暗處，如樹林或竹林內。
- (二) 病媒蚊孳生的場所為家屋內外或家屋附近盛水之各種容器，比如水缸、水甕、鐵桶、木桶、塑膠桶、水泥槽、廢輪胎、花瓶、花盤、空罐、破瓶等人工容器及樹洞、竹洞、屋簷、排水溝等。

## 消滅蚊幼蟲(孑孓)防止傳染病最法方法：

- (三) 清除孳生源為將上述病媒蚊的孳生場所清除乾淨，不需要的容器丟掉，必須盛水的容器例如花瓶、水缸等至少每週要倒棄一次，以便清洗。清洗時必須用刷子將內壁用力刷洗，才將病媒蚊的卵洗淨。
- (四) 室內外容易積水地方都是蚊子孳生的場所，應徹底清除，並保持乾燥，室內外勿堆積雜物，以免蚊子藏匿。

## 請注意您的家中及周圍環境，消除蚊蟲孳生場所！

室內孳生源：冰箱底盤、花瓶、水生植物容器、水槽、貯水缸。應每週清洗、換水。

室外孳生源：廢輪胎、花盆、空罐。清除後，交清潔隊運走或通知環保局處理。

中興國小 關心您！

