



預防登革熱，解除蟲蟲危機！

請不要堆積雜物、清除積水容器、全力撲滅病媒蚊！

什麼是登革熱？

登革熱俗稱『天狗熱』或『斷骨熱』是由登革熱病毒引起的急性傳染病它的傳播媒介是埃及斑蚊及白線斑蚊。

登革熱的症狀

典型登革熱疑似病例之症狀為發燒（38度以上）、激烈頭痛，後眼窩痛，骨骼關節或肌肉痛、發燒三～四天，身上出現紅疹，發燒期間全身發癢。出血性登革熱疑似病例主要有發燒、頭痛、肌肉痛、嘔吐、全身倦怠、腸胃道及子宮出血、血尿和恢復期出疹等。

登革熱的傳染途徑：

- (1) 登革病毒，只能存於人、猴及病媒蚊體內。
- (2) 登革熱之病媒蚊為埃及斑蚊和白線斑蚊。
- (3) 病毒必須藉由病媒蚊叮咬才能從人傳給人。
- (4) 病媒蚊叮咬登革熱病患（從開始發燒的前一天直到退燒都具有傳染力）八至十五天後，則具有終生傳染病毒的能力。

清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生，是防治登革熱的根本方法：

- (一) 傳播登革熱的病媒蚊是埃及斑蚊及白線斑蚊。這兩種蚊子都是在白天吸血，吸血場所大多在屋內或野外陰暗處，如樹林或竹林內。
- (二) 病媒蚊孳生的場所為家屋內外或家屋附近盛水之各種容器，比如水缸、水甕、鐵桶、木桶、塑膠桶、水泥槽、廢輪胎、花瓶、花盤、空罐、破瓶等人工容器及樹洞、竹洞、屋簷、排水溝等。

消滅蚊幼蟲(孑孓)防止傳染病最法方法：

- (三) 清除孳生源為將上述病媒蚊的孳生場所清除乾淨，不需要的容器丟掉，必須盛水的容器例如花瓶、水缸等至少每週要倒棄一次，以便清洗。清洗時必須用刷子將內壁用力刷洗，才將病媒蚊的卵洗淨。
- (四) 室內外容易積水地方都是蚊子孳生的場所，應徹底清除，並保持乾燥，室內外勿堆積雜物，以免蚊子藏匿。

請注意您的家中及周圍環境，消除蚊蟲孳生場所！

室內孳生源：冰箱底盤、花瓶、水生植物容器、水槽、貯水缸。應每週清洗、換水。
室外孳生源：廢輪胎、花盆、空罐。清除後，交清潔隊運走或通知環保局處理。

