

宜蘭縣立員山國民中學

101 學年度七年級正確用藥知識-前側分析統計結果

班級人數	25	27	26	26	26	27	157	答對率
題目 \ 班級	101	102	103	104	105	106	合計	
1、如果同時看了不同的醫師，應主動告訴醫師或藥師，以免所開的藥品重複，甚至發交互作用。	22	23	21	22	24	25	137	87.3%
2、生病很可憐了，為慰勞自己，吃藥應該配牛奶、果汁。	21	22	23	21	23	21	131	83.4%
3、這顆要好難吞喔，把它磨碎，對藥效應沒影響。	20	21	19	23	21	22	126	80.3%
4、服用藥品後，若出現任何不適的症狀，如果影響不大，我可以自行停藥或刪減藥量或改變吃法。	20	21	22	23	21	20	127	80.9%
5、飯後服用的藥物，指的是飯後一小時內。	22	23	21	22	21	22	131	83.4%
6、眼藥水期限為開封後一個月，即使未用完，也應拋棄。	20	21	21	20	22	23	127	80.9%
7、地下電台收聽率這麼高，主持人又小有名氣，他賣的藥應該也不錯。	21	22	19	17	18	20	117	85.4%
8、飯前服用的藥物，指的是吃飯前一小時或飯後二小時。	16	17	19	20	19	16	107	81.7%
9、上次感冒還剩下很多藥，為避免浪費，我可以把我的感冒藥分享給我的朋友吃。	21	16	15	19	17	17	105	83.3%
10、正確用藥要五大核心能力包含有：(1)清楚表達自己的身體狀況；(2)看清楚藥品標示；(3)清楚用藥方法、時間；(4)做身體的主人；(5)與藥師、醫師做朋友。	19	21	18	17	18	18	111	87.4%

宜蘭縣立員山國民中學

101 學年度七年級正確用藥知識-後側分析統計結果

班級人數	25	27	26	26	26	27	157	答對率
題目 \ 班級	101	102	103	104	105	106	合計	
1、如果同時看了不同的醫師，應主動告訴醫師或藥師，以免所開的藥品重複，甚至發交互作用。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
2、生病很可憐了，為慰勞自己，吃藥應該配牛奶、果汁。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
3、這顆要好難吞喔，把它磨碎，對藥效應該沒影響。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
4、服用藥品後，若出現任何不適的症狀，如果影響不大，我可以自行停藥或刪減藥量或改變吃法。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
5、飯後服用的藥物，指的是飯後一小時內。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
6、眼藥水期限為開封後一個月，即使未用完，也應拋棄。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
7、地下電台收聽率這麼高，主持人又小有名氣，他賣的藥應該也不錯。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
8、飯前服用的藥物，指的是吃飯前一小時或飯後二小時。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
9、上次感冒還剩下很多藥，為避免浪費，我可以把我的感冒藥分享給我的朋友吃。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%
10、正確用藥五大核心能力包含有：(1)清楚表達自己的身體狀況；(2)看清楚藥品標示；(3)清楚用藥方法、時間；(4)做身體的主人；(5)與藥師、醫師做朋友。	25	27	26	26	26	27	157	100.0%

員山國中101學年度正確用藥教育前後測

